## MUBOE SJEKTPUYECTBO

Эбонитовый круп-диаметром IIO мм, толщина 8-10 мм, можно дечить кирургические, инфекционные и нервные заболевания.

Введение в организм дополнительной электроэнергии через кожу с помощью поглаживания кружка эбонита по коже 15 минут.

- I. <u>Лечение гриппа</u> (два раза в день по 15 минут) лоб, щеки, подбородок. Щеки по часовой стрелке.
- 2. При головной боли, боли в ушах, гипертонической болезни I-2 степени, распираторных заболеваниях - I раз в день по I5 минут.
- З. При полиатоите отложении солей гладить кружком эбонита правой рукой туловище больного (живот,спину) круговыми движениями, а левой рукой держать больного за пальщы стопы замыкание цепи 15 минут. За пальщы одной стопы затем за пальщы другой стопы продолжая гладить туловище, замыкая цепь то левой, то правой рукой. При отсутствии помощника самопоглаживание производить больных суставов по кругу. Иногда неприятные ощущения с покалыванием в области сердца вынуждают прекратить процедуру и на следующий день уменьшить время нагрузки.

  При радикулите помощник правой рукой кружком эбонита по кругу гладит поясничную область, а левую рукуй вышшиними ладонь ю положить на живот больного. При плохом скольжении кружка, кожу слегка посыпать т альком. Пля выздоровления требуется I—IO процедур. Производить лечение можно дома, но пой наблюдением врача.

При воспалении вен (тромбойлебите) на ночь к больному месту прибинтовывают пластинку или кружик. Можно и нужно гладить кружком по здоровой области ноги или тудовища. Например, появилась боль в икроножной мышце, голени, помощник 15 минут гладит бедро по кругу выше коленного сустава, а левой рукой замыкает цепь, взявшись за пальцы больной ноги.

При воспалении легких помощник по кругу гладит впину, а левой рукой (ладонь) положить поближе к шее.

При нагноении + фаланги пальца для сохранения ногтя следует помощнику взять в кулак большой палец, а правой рукой гладить по предплечно больной руки по эллипсу вверх к локто, вниз к ладони, через 3-4 минуты боль утихнет. Ежедневная процедура заканчивается прибинтовиванием к ладони больного пластинки на ночь (на больную руку).

- I. Нассивное положение пластинки на кожу больной области:
- а) при радикулите на ночь прибинтовывать к болезненной области позвоночника;
- б) при полиартрите на ночь прибинтовывать к наиболее болезненному суставу;
  - в) при переломе костей к месту перелома:
  - га при отложении солей к наиболее болезненному суставу;
  - п) при миозите к наиболее болезненному месту:
    - е) при гриппе и распираторных заболеваниях к груди и лопатке:

班)

При покалывании в области сердца — процедуру прекратить, а на следующий день уменьшить время нагрузки.Гладить по коже медленно; не вызывая неприятных ощущений, при их появлении — процедуру прекратить.Прпедура — 15 минут.Контроль врача. Эбонит мыть после каждого применения водой с мылом.Средний курс лечения — 10 дней. При необходимости — курс лечения повторить. Эбонит хранить в темном месте.

## EMBOR SAERTPHYLICTHO

Висцение в организм понолнительной ал. энергии через кожу с помощью погменимания кружих збонита по коже 15ммнут.

- І.Лечение тумина (два раза в день по 15 минут) лоб,щеки, подбородок, щеки по часовой стреже.
- 2. При головной боли, боли в умах, гипертонической болезии 1-2 отенени, респираторных заболевеннях - I раз в день по 15 минут.
- З. При немиартрите, отложении солей- гладить кружием вбонита правой рукой туломице бельного (живот-синиу) ируговым димленизми, а левой рукой дермать больного за пальщи стоим замыжание цени 15 минут. За намыци одной стоим, ватем за нальщи другой стоим-процеджия гладить туломице, замыжан цень то левой, то правой рукой. При отсутствии немершика самоногизминание производить больных суставов по кругу. Иногиа неправитные ощущении с поналивативны в области сердца выпуждают прекратить процедуру и на следующей день уменьшить время нагружия. При размиумите немещини правой рукой пружком по кругу гладит поленичную область, а левой рукой-поленть ладонь на живот больного. При илеком спольжении кружка, кому смегка посшенть тальком. Для виздоровнения требуется I-IO процедур. Производить лечение можно цема, но под наблюдением врача.

При воснавении вен (тромоодлебите) на ночь и больному месту прибинтовивают пластиму мли ируков. Можно и пужно гладить кружом по впоровой области моги мли тулопица. Например, появилась боль в икрономной меще, голени, помощим 15 минут гладит белро по кругу инне коленного сустава, а девой рукой заминает цень, взяршись за ми палым больной ноги.

При воспилении легинх номощим по кругу гладит спину, а левой рукой (ладонь) положить поблике и нее. При нагноенки фаланти нальца для оохраненки ногтя следует помощикку взять в кулан больной палец, а превой рукой гладить по предплечью больной руки по одлинеу вверх и локто, вика и ладоми, через 3-4 минути боль утихнот. Вкоцневная процедура заканчивается прибинующиванием и ладони больного пластинки на ноже (на больную руку).

- I. Пассивное паложение пластинки на кому больной области:
- а) при радикулите на новь прибинтовивать и болевненной области повъоночника;
- б) при нолиартрите на ночь прибинтовизать и наиболее болезнениему суставу;
  - в) при переломе костей к месту перелома.
  - г) при отношении солей и наиболее болезненному суставу;
  - п) при множите к наизолее болевнениому месту;
- е) при грише и респиреторних заболеваниях и групи и лование.

При помаливания в области серцца — процепуру прекратить, а на следущий цень уменьшить проме нагрузки. Глацить по коже мещению, не вышкая неприятных слущений, при их полиления — процедуру прекратить. Процедура — 15 минут. Контроль врача. Эбонит мить после каждого применения водой с мылом. Средики курс лечения — 10 плей. При необходимости — курс лечения повторить. Эбонит кринить в темном месте.